

Programa de prevención de cáncer de cuello uterino

El Cáncer de cuello uterino es en nuestro País el segundo cáncer ginecológico y es una de las causas de mayor morbimortalidad evitable de la patología oncológica en la mujer. La detección precoz es la manera de disminuir la morbimortalidad de esta patología.

Causas más frecuentes

El mayor riesgo lo presentan las mujeres con:

- Relaciones sexuales tempranas y frecuentes
- Primer embarazo temprano
- Múltiples parejas sexuales
- Numero excesivos de partos
- Frecuentes infecciones ginecológicas, de transmisión sexual (papilomas, herpes virus tipo II).

Síntomas más frecuentes

Los síntomas más frecuentes y comunes son:

- Leucorrea (flujo blanquecino y viscosa de mal olor)
- Hemorragia vaginal
- Hemorragia post-coito
- Anemia ferropénica
- Metrorragias profusas
- Dolor pélvico
- Obstrucción urinaria

Métodos diagnósticos

El **PAP** es la principal prueba diagnóstica, es uno de los métodos más eficaces para determinar si hay células anormales en el cuello uterino. Es una prueba sencilla, rápida y económica que se realiza en el consultorio y demanda muy pocos minutos.

La **colposcopia** se utiliza para detectar ciertas lesiones, es posible por este método determinar hasta el 90% de las lesiones displásicas. Este método permite marcar las zonas sospechosas para luego tomar las biopsias.

La **conización** consiste en extraer quirúrgicamente una parte de los tejidos en forma de cono del cuello uterino y del canal cervical. Esta prueba diagnóstica suele servir como tratamiento cuando por medio de la misma se logra erradicar toda la lesión.

Tratamiento

Los mismos comprenden desde una intervención mínima (conización) hasta la cirugía mayor y/o el tratamiento quimioterápico.